

A. TRITSCHBERGER¹, H. JAVELOT², A. ROUSSEAU-VOISIN¹, S. WEIBEL³





¹ Pharmacie à usage intérieur, EPSAN, Brumath, France

² Centre de Ressources et d'Expertise en PsychoPharmacologie (CREPP) Grand Est, Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN), Brumath, France

³ Service de psychiatrie adulte, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

EPSAN Etablissement Public de Santé Alsace Nord

PROBLEMATIQUE :

-  Augmentation des prescriptions de METHYLPHENIDATE, notamment chez l'adulte
-  Professionnels de santé par toujours suffisamment formés
-  Absence de recommandations nationales proposées par les instances de santé sur la prise en charge du TDAH chez l'adulte
-  Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) pas toujours adaptés à l'adulte

Dr S. Weibel, Dr H. Javelot, Dr A. Rousseau-Voisin et Dr A. Tritschberger

Création d'un **comité d'organisation** pour l'élaboration de recommandations formalisées d'experts (RFE) françaises sur la prise en charge médicamenteuse du TDAH* (quantification de l'accord professionnel par la méthode du groupe nominal adapté de la RAND/UCLA)

*en collaboration avec les sections TDAH et Neuropsychopharmacologie de l'AFPBN



RFE et autres recommandations officielles (ex: HAS) ne sont pas antinomiques
→ viennent en complément, notamment sur l'aspect pratico-pratique

L'ENCÉPHALE

Diffusion et valorisation

05/2024

Finalisation des recommandations

05/2024

Relecture

05/2024

Analyse des réponses et de rédaction des recommandations

04/2024

Phase de cotation

02-03/2024

Elaboration du questionnaire

02 à 10/2023

Comité scientifique

Groupe de lecture

Comité scientifique

Comité scientifique

Groupe de cotation = experts

Comité scientifique

= membres du comité d'organisation
+ Dr Anne CLARET-TOURNIER (AP-HP)
+ Dr Romain ICICK (AP-HP)
+ Pr Nader PERROUD (HUG)

Préambule : revue de la littérature des recommandations disponibles + analyse des RCP des différents traitements du TDAH

QUESTIONNAIRE : 2 thématiques

1. Le traitement par METHYLPHENIDATE

- a) Généralités
- b) Contre-indications
- c) Effets indésirables

2. La création d'un arbre décisionnel pour la prise en charge médicamenteuse du TDAH

- a) Situations sans comorbidités
- b) Situations particulières : sujet âgé, grossesse et comorbidités (dépression, trouble bipolaire, schizophrénie, trouble de la personnalité borderline, trouble anxieux, troubles du spectre autistique et addictions)